




ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ! КОРИЧНЕВО-МРАМОРНЫЙ КЛОП!

<u>Выход клопа из мест зимовки</u> и начало активного питания наблюдается при среднесуточной температуре +15 °С	Осматривайте любимые кормовые растения клопа – лавровишню, шелковицу, розоцветные, фундук. <u>Применяйте феромонные ловушки</u> для обнаружения вредителя: - в садах и на полях – 1 шт/га, - в частном секторе – 1 шт/участок, - в теплицах -1 шт/ 1000 м ² . Для отлова и уничтожения вредителя: - в садах и на полях – 13 шт/га, обработка инсектицидами вокруг места установки ловушки.	
<u>Спаривание и откладка яиц</u> через 10-14 дней после выхода клопов с зимовки	Осматривайте листья растений с нижней стороны, на которой располагаются кладки яиц. Яйца белые шаровидные, кучками 20-30 штук. При обнаружении яйцекладки механически уничтожаются. Этот метод позволит уничтожить будущее потомство в количестве до 300 экз. от одного клопа.	
<u>Отрождение личинок</u> через 5-7 дней после откладки яиц	Личинки имеют пять возрастов: - в первой стадии личинки оранжево-черные; - во второй стадии – черные; - в следующих стадиях – серо-коричневые, с белыми пятнами на ногах и усиках, быстро бегают. Обработку рекомендованными препаратами проводить в утренние и вечерние часы, соблюдая регламенты применения инсектицидов и меры безопасности. При высокой численности провести повторную обработку через 14 дней.	 
<u>Уход клопа на зимовку</u>	Начиная со второй декады сентября и до весны проводите регулярный осмотр укрытий, сбор и уничтожение имаго клопа. Устройте клопам фальшзимники – развесьте на участке на высоте 2-3 метра картонные коробки, наполненные мягким гофрированным картоном. Коробки потом необходимо сжечь.	

РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 8(495)661-09-91 (Москва), 8(861)22454-07 (Краснодар)